

T8214
2022.03.25 15:36

核准日期：2007年03月06日
修改日期：2009年10月22日



去痛片说明书

COMPOUND AMINOPYRINE PHENACETIN TABLETS

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

国药准字H42021306

【药品名称】

通用名称：去痛片
英文名称：Compound Aminopyrine Phenacetin Tablets
汉语拼音：Qutong Pian

【成份】本品为复方制剂，其组分为：“每片含氨基比林0.15g、非那西丁0.15g、咖啡因0.05g、苯巴比妥0.015g”。

【性状】本品为白色片。

【适应症】用于发热及轻、中度的疼痛。

【规格】复方。

【用法用量】需要时服用，一次1—2片，一日1—3次。

【不良反应】本复方所含氨基比林和非那西丁均有明显不良反应。服用氨基比林可有呕吐、皮疹、发热、大量出汗及发生口腔炎等，少数可致中性粒细胞缺乏、再生障碍性贫血、渗出性红斑、剥脱性皮炎、龟头糜烂等。长期服用非那西丁可引起肾乳头坏死、间质性肾炎并发生急性肾功能衰竭，甚至可能诱发肾盂癌和膀胱癌，还可造成对药物的依赖性。非那西丁还易使血红蛋白形成高铁血红蛋白，使血液的携氧能力下降，导致紫绀，还可引起溶血、肝脏损害，并对视网膜有一定毒性。

【禁忌】对氨基比林、非那西丁、咖啡因或苯巴比妥类药物过敏者禁用。

【注意事项】

- (1) 本品长期服用，可导致肾脏损害，严重者致肾乳头坏死或尿毒症，甚至可能诱发肾盂癌和膀胱癌。不宜长久使用，以免发生中性粒细胞缺乏，用药超过1周要定期检查血象。
- (2) 氨基比林在胃酸下与食物发生作用，可形成致癌性亚硝基化合物，特别是亚硝酸胺，因此有潜在的致癌性。
- (3) 长期服用可造成依赖性，并产生耐受。
- (4) 对各种创伤性剧痛和内脏平滑肌绞痛无效。
- (5) 严禁用于食品和饲料加工。

【孕妇及哺乳期妇女用药】禁用。

【儿童用药】未进行该项实验且无可靠参考文献。

【老年用药】更易致肾功能损害，宜慎用。

【药物相互作用】未进行该项实验且无可靠参考文献。

【药物过量】未进行该项实验且无可靠参考文献。

【药理毒理】

药理作用：为一复方解热镇痛药。其中氨基比林和非那西丁能抑制下视丘前列腺素的合成和释放，恢复体温调节中枢神经元的正常反应性而起退热作用；同时还通过抑制前列腺素的合成而起镇痛作用。氨基比林并能抑制炎症局部组织中前列腺素的合成和释放，稳定溶酶体酶，影响吞噬细胞的吞噬作用而起抗炎作用。咖啡因为中枢神经兴奋药，能兴奋大脑皮层，提高对外界的感应性，并有收缩脑血管，加强前两药缓解头痛的效果。苯巴比妥具有镇静、催眠、抗惊厥作用，可增强氨基比林和非那西丁的镇痛作用，并预防发热所致之惊厥。

毒理研究：未进行该项实验且无可靠参考文献。

【药代动力学】未进行该项实验且无可靠参考文献。

【贮藏】密闭，在干燥处保存。

【包装】口服固体药用高密度聚乙烯瓶装：100片/瓶，1000片/瓶；药用铝箔和聚氯乙烯固体药用硬片包装：10片×2板/盒。

【有效期】24个月

【执行标准】部颁标准化学药品及制剂第一册[WS1-15(B) 89]。

【批准文号】国药准字H42021306

【药品上市许可持有人】

企业名称：远大医药（中国）有限公司

注册地址：湖北省武汉市硚口区硚口路160号1幢23层1-6号

【生产企业】企业名称：远大医药（中国）有限公司

生产地址：武汉市东西湖区金银湖生态园环湖中路11号

邮政编码：430040

业务咨询电话：027-83382850 400-990-9697

投诉、不良反应电话、传真：027-83382826

投诉、不良反应邮箱：ydyypg@grandpharma.cn

网 址：http://www.grandpharma.cn

远大医药(中国)有限公司
GRANDPHARMA(CHINA)CO.,LTD
NBD025-4

朱志超 2022-03-25

产品名称	去痛片说明书	工 艺	单面印刷(黑白)
产品规格	复方	打印日期	
成品尺寸	125mmx180mm	生产单位	武汉光华印务有限公司
产品材质	70g双胶	版本号	NBD025-4
修订说明			